



A sensibilidade do autoconhecimento

A primeira e mais completa linha de exames para alergias alimentares tipo III

ImuXPro
Right Food. Better Health.

 **ANAACLINGENE**
LABORATÓRIO DE GENÉTICA ✨



Qual é a diferença entre a alergia clássica e a alergia alimentar tardia?

Em comum, o sistema imunológico é envolvido em ambas as alergias. Mas há algumas diferenças na maneira que ele reage.

A sensibilidade do autoconhecimento com Imupro

Alergias alimentares IgG (tipo III) estão criando cada vez mais desafios à saúde já que normalmente não são detectadas. A dificuldade na identificação ocorre pelos seus sintomas aparecerem somente horas ou dias após o consumo do alimento gatilho.

Graças ao ImuPro, um teste diagnóstico e conceito nutricional, é possível identificar essas alergias de modo confiável e descobrir se elas são a origem das reclamações crônicas do seu paciente.

Uma alergia clássica tipo I é quando o sistema imunológico produz anticorpos específicos IgE que levam a uma reação alérgica imediata. O ImuPro não detecta essas alergias alimentares IgE.

Já a alergia clássica tipo III é quando o sistema imunológico reage a alérgenos alimentares normalmente inofensivos e produz anticorpos IgG específicos.

Os sintomas aparecem em até três dias após o consumo do alimento gatilho, podendo ser dores crônicas, doenças gastrointestinais, problemas na pele e excesso de peso.



Exames:

- IMUPRO SCREEN
(painel com 44 alimentos)
- IMUPRO BASIC
(painel com 90 alimentos)
- IMUPRO BASIC +
(painel com 180 alimentos)
- IMPUPRO COMPLETE
(painel com 270 alimentos)

Conceito Imupro

O ImuPro combina uma análise de sangue confiável para alergias alimentares tardias mediadas por IgG.

Em uma análise realizada por um laboratório de diagnósticos especializado em in vitro, são identificados os níveis de anticorpos IgG específicos para uma ampla gama de produtos alimentícios no sangue coletado. Testar os alimentos individualmente permite que os pacientes mudem sua dieta de forma seletiva, baseado em seus resultados e com limite ao nível de restrição necessária.

Baseado nos resultados obtidos, fornecemos os resultados do teste e orientações nutricionais que contém três importantes pilares:

1º Fase de Eliminação


Nesta fase o paciente irá consumir somente comidas sem níveis elevados de anticorpos IgG em um ciclo de rotação de 4 dias, de modo que os processos inflamatórios possam ser reduzidos ou cessados e seja prevenida o desenvolvimento de novas alergias.


2º Fase de Provocação

Após a fase de eliminação, o paciente irá incluir gradualmente os alimentos evitados. Como será um alimento por vez, será possível encontrar os alimentos gatilho pessoais de cada pessoa e descobrir qual é o responsável pelas reações identificadas.

3º Fase de Estabilização

Esta terceira fase durará pelo menos um ano, onde o paciente irá evitar os alimentos gatilhos identificados a fim de que os anticorpos IgG se degradem e o corpo se recupere. Após, será iniciada outra Fase de Provocação para uma reavaliação.





Com o **IMUPRO** você entrará em contato com sua sensibilidade alimentar e poderá experimentar uma vida plena.

Descubra quais são os alimentos que causam a alergia alimentar tipo III em você e esteja sempre em harmonia com sua saúde.



Av. República Argentina, 1336 - Sala 205 - Vila Izabel
Curitiba/PR - CEP 80620-010

